

第 1876 圖

た
で
科



みづひき (毛蓼)

Polygonum filiforme Thunb.

(= *P. virginianum* L. var. *filiforme*

Nakai; *Tovara filiformis Nakai*.)

山地或ハ山足地或ハ林叢邊ニ多ク生ズル多年生草本。莖ハ直シテ疎ニ分枝シ、高サ 50-80cm 許アリテ長毛ヲ布キ節隆ク質硬シ。葉ハ短柄ヲ有シテ互生シ、廣椭圆形又ハ倒卵形ニシテ葉頭ハ鋭形、葉底ハ鈍形ヲ呈シ、長サ 5-15cm 許、質薄シテ稍硬ク兩面トモ毛ヲ散生シ葉面往々墨記斑アリ。夏秋ノ候、梢上ニ數條ノ長鞭狀細長花軸ヲ抽キ、疎穂狀ニ赤色ノ小花ヲ着ク。花ハ短キ小梗ヲ有シ開出シテ少シク弓曲シ、下面ハ色淡シ。萼ハ四裂シ、裂片ハ卵形ニシテ稍鋭頭ヲ有シ長サ 2-3mm 許。花瓣無シ。雄蕊ハ五本。卵圓形子房ノ頂ニ粗大ナル花柱二本アリテ子房ヨリ長シ。瘦果ハ兩凸面ノ卵形ヲ成シ之レト同長ノ宿存萼ニ包マレ長サ 2.5mm 許アリ、遺存セル花柱ハ宿存萼上ニ斗出シ先端鈎曲シ下方ニ曲レリ。白花品ヲきんみづひき (f. *albiflora Makino*)、紅白相雜ル品ヲくしよみづひき (f. *bicolor Makino*) ト云フ。和名ハ水引ニシテ其花穂ヲ水引ニ擬セシモノナリ。漢名 金線草 (蓋シ誤用)

第 1877 圖

た
で
科



いたごり (虎杖・黄蘗子)

一名 たんじ・さいたな

古名 たぢひ・さいたづま

Polygonum Reynoutria Makino.

(= *Reynoutria japonica* Houtt.;

P. cuspidatum Sieb. et Zucc.)

山野到ル處ニ多ク生ズル大形ノ多年生草本。根莖ハ木質ニシテ黄色、皮色褐色ニシテ長ク地中ヲ貫通シテ延ビ諸處ニ苗ヲ萌出ス。莖ハ通常粗大ニシテ直立或ハ斜傾シ高サ 30cm-1.5m 許ニシテ分枝シ、中空ナル圓柱形ニシテ嫩時紅紫點ヲ散布シ、節ニ膜質ノ短キ鞘狀托葉アリ、冬時木質ノ枯莖殘留ス。葉ハ有柄互生シ、廣卵形又ハ卵状椭圆形ニシテ短鋭頭、底部截形、長サ 5-15cm 許、質硬シ。夏日、枝上葉腋並ニ枝端ニ複總狀様花穂ヲ成シテ多數ノ小白花ヲ密ニ着ク。雌雄異株、萼ハ五裂シ、長サ 2mm 弱、外列ノ三片ハ背面ニ翼ヲ有シ、果時成長シテ長サ 7mm 餘ニ達ス。花瓣無シ。雄花ニハ雄蕊アリ。雌花ノ子房上ニ三花柱アリ。瘦果ハ三稜アル瘦卵形ニシテ暗褐色ヲ呈シ翅狀ヲ成セル宿存萼ニ包マル。花色紅ナルヲベにいたどり一名めいけつさう (f. *colorans Makino*) ト云フ、然レドモ株ニヨリ其色ニ濃淡アリテ白花ノ普通品ニ達ス其間截然タル區別線無ク只其株ニ大小アルノミナリ、山地ニ在ル者往々其株低矮ニシテ花穂密ニ束集ス之レヲをのへいたどり (f. *compacta Makino*) ト云フ、餅狀ニシテ酸味アル嫩莖ヲ生食シ或ハ煮食シ民間ニテ其根莖ヲ藥トス。和名いたごりハ疹ミヲ取り去ル藥效アル故疹取ト云フト雖ドモ果シテ眞乎否乎。

第 1878 圖

た
で
科



おほいたごり

Polygonum sachalinense Fr. Schm.

(= *Reynoutria sachalinensis Nakai*.)

我邦北地ノ山野ニ多キ大形ノ多年生草本ナリ。根莖ハ横臥シ肥厚ニシテ皮色褐色内部黄色ヲ呈ス。莖ハ高サ 2-3m ニ達シ、多少弓狀ニ傾キ、中空ノ圓柱形ヲ成シ、質硬クシテ綠色ヲ呈シ日ヲ向クレバ紅染シ、上部ニ分枝シ、嫩芽ハ筒狀ヲ成シ往々紅色ヲ呈シテ美ナリ。葉ハ互生シテ葉柄ヲ有シ、頗ル大形ニシテ卵形又ハ長卵形ヲ成シ、短鋭頭、底部心臟形ヲ呈シ、長サ 40cm 餘ニ達シ、葉裏ハ淡白色ナリ。鞘狀托葉ハ膜質。夏秋ノ候梢上葉腋ニ複總狀花序ヲ成シテ多數白色ノ小花ヲ着ク。雌雄異株。萼ハ五裂シ、長サ 2mm 弱。無花瓣。雄花ニハ八雄蕊アリテ微シク萼ヨリ長シ。雌花ニ在テハ外側萼三片ノ背部ニ翼ヲ有シ花後成長シテ果實ヲ包ム、花中長卵形ノ子房アリテ頂ニ短キ三花柱ヲ有ス。瘦果ハ三稜形ナリ。和名ハ大虎杖ノ意ニシテ草狀普通ノいたごりに比スレバ大形ナルヨリ云フ。

おやまそば

Polygonum Kakai Makino.

(= *Pleuropteryrum Kakai Hara*.)

本州中部北部ノ高山ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ 30cm 内外アリ。莖ハ太ク強壯、上部繁ク分枝シ、硬クシテ疎毛ヲ生ズル枝ハ斜ニ展開シテ全株ハ低キ叢ヲ形成ス。葉ハ有柄互生、卵状椭圆形ヲ成シテ洋紙質ヲ呈シ、長サ 3-5cm、鋭頭ニシテ鈍端、圓底或ハ廣楔底ノ者多ケレドモ枝條ノ者ニ於テハ鋭底ヲ呈ス、全邊ニシテ疎縁毛ヲ生ジ、表面ハ毛乏シケレドモ裏面ノ脈上ニハ偃毛ヲ見ル。八月莖頂ニ長サ 4-5cm ノ稍疎ナル穂狀様花穂ヲ成シテ多數ノ細花ヲ着ク。花ハ白色或ハ淡紅ヲ帶ル帶綠色ヲ呈ス。萼ハ五深裂。無花瓣。稍萼ヨリ短キ八雄蕊アリ。瘦果ハ宿存萼ニ包マレ、三稜アル椭圆形ヲ成ス。和名 御山蕎麥ハ花容そばニ似テ御山ニ生ズルヨリ云フ、御山ハおやまニテ加賀ノ白山ヲ云フ。

第 1879 圖

た
で
科



うらじろたて

Polygonum Weyrichii Fr. Schm.

(= *Pleuropteryrum*

Weyrichii Gross.)

中部以北ノ高山帯ニ見ル多年生草本ナレド往々下降シテ溪谷ノ礫地ニ生ズ。莖ハ強壯ニシテ簇生スレド分枝スルコト少シ。高サ 30cm-1m ニ達ス。葉ハ互生シ比較的短キ葉柄ヲ有シ、闊大ニシテ長卵形或ハ卵状椭圆形ヲ成シ長サ 10-20cm、先端鋭尖シ葉底ハ截形或ハ廣楔形、表面ハ深綠色ニシテ短毛ヲ布キ且支脈規則正シク羽狀ニ陥入スレド裏面ハ密ニ帶微褐色ノ白軟毛ヲ以テ被ハレ、質厚ク且軟ナリ。夏日、頂ニ複總狀ノ圓錐花序ヲ成シテ多數ノ黄白色小花ヲ密集ス。雌雄異株ナリ。萼ハ五深裂シ長サ 2mm 許、裂片ハ椭圆形ヲ成ス。花瓣無シ。雄花ニハ雄蕊十箇内外。雌花ニハ一雌蕊アリテ卵形子房上ノ花柱ハ三岐ス。瘦果ハ廣椭圆形、乾皮質ノ廣翼三片アリテ長サ 5mm 内外、熱シテ褐色ヲ呈シ平滑ニシテ多少ノ光澤アリ。和名ハ裏白蓼ニシテ其葉裏白色ナルヨリ斯ク云フ。

第 1880 圖

た
で
科



おんたて

一名 いはたて・はくさんたて

Polygonum Weyrichii Fr. Schm.

var. *japonicum Makino.*

(= *Polygonum polymorphum Ledeb.* var.

japonicum Maxim.; *P. Savatieri Nakai*;

Pleuropteryrum Savatieri Koidz.)

高山ノ砂礫地ニ生ズル大形ノ多年生草本ニシテ地下莖ハ深ク土中ニ入ル。莖ハ粗大ニシテ直立シ、高サ凡 20-80cm 許アリテ多クハ疎ニ分枝シ綠色或ハ淡紅紫色ヲ帶ビ無毛ナリ。葉ハ互生シテ葉柄ヲ有シ、大形ニシテ廣卵形或ハ卵形ヲ呈シ鋭尖頭ヲ成シ、葉底圓形ニシテ葉柄ニ向ヒ鋭形ヲ呈シ、葉緣ハ全邊ナリ、質厚クシテ微毛ヲ有シ後無毛ト成ル、枝上ノ葉并ニ梢葉ハ漸次ニ狭小ナリ。鞘狀托葉ハ膜質ナリ。夏日莖頂并ニ枝頂ニ複總狀ノ圓錐花序ヲ成シ多數ノ帶黄白色小花ヲ綴ル。雌雄異株ナリ。萼ハ五深裂シ、長サ 2mm 許。花瓣無シ。雄花ニハ八雄蕊アリ。雌花ニハ卵形ノ子房アリテ其花柱ハ三岐ス。瘦果ハ宿存萼ヨリ數倍長ク長サ 6-7mm、三翼ヲ有シ各面廣椭圆形ヲ呈ス。予ハ今之レヲうらじろたてト同種ト斷ジ本品ヲ以テ其一種ト爲シタリ。和名 御藪ハ蓋シ信州御嶽ニ基ケル稱ナラン、岩藪ハ岩地ニ生ズルたてノ意、白山蓼ハ加州白山ニ生ズルヨリ云フ。

第 1881 圖

た
で
科

